

Impfplan für Kinder, für Erwachsene und Reiseschutzimpfungen

Impfplan für Kinder Alter	Impfung gegen
ab Beginn 3. Lebensmonat	1. Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Poliomyelitis (IPV), Hepatitis B
ab Beginn 4. Lebensmonat	2. Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus
ab Beginn 5. Lebensmonat	3. Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus 2. Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Poliomyelitis (IPV), Hepatitis B
ab Beginn 12. bis 15. Lebensmonat	4. Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus; 3. Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Poliomyelitis (IPV), Hepatitis B; 1. Masern, Mumps, Röteln
5. bis 6. Lebensjahr	1. Auffrischung Diphtherie, Tetanus; 2. Masern, Mumps, Röteln
11. bis 18. Lebensjahr	1. Auffrischung Poliomyelitis; 2. Auffrischung Diphtherie, Tetanus; Grundimmunisierung Hepatitis B (für ungeimpfte Jugendliche); 2. Masern, Mumps, Röteln (bei fehlender 2.MMR - Impfung) Achtung für alle Mädchen: mindestens die 2. Röteln - Impfung

Auffrisch- und Nachholimpfungen für Erwachsene	(ohne Reiseschutzimpfungen)	
Diphtherie	alle Erwachsenen	Grundimmunisierung, Auffrischung alle 10 Jahre
FSME (Zeckenzephalitis)	gefährdete Personen in Endemiegebieten	Grundimmunisierung, Auffrischung*
Hepatitis A	bestimmte Berufsgruppen, Personen mit erhöhter Infektionsgefahr	Grundimmunisierung, Auffrischung*
Hepatitis B	bestimmte Berufsgruppen, Personen mit erhöhter Infektionsgefahr	Grundimmunisierung, Auffrischung bei bestimmten Blutwert, sonst alle 10 Jahre
Influenza (Grippe)	bestimmte Berufs- und Risikogruppen, Personen über 60 Jahre	Jährlich
Pneumokokken	Personen über 60 Jahre, bestimmte Risikogruppen	Grundimmunisierung, Auffrischung*

Poliomyelitis	alle Erwachsenen	Grundimmunisierung, Auffrischung nur bei Indikation
Tetanus	alle Erwachsenen	Grundimmunisierung, Auffrischung alle 10 Jahre
Tollwut	bestimmte Berufsgruppen	Grundimmunisierung, Auffrischung*
Auffrischungsintervalle unterschiedlich. Bitte fragen Sie nach!		

Reiseschutzimpfungen	
Cholera	Bei Forderung des Ziel- oder Transitlandes (nur noch im Ausnahmefall)
Diphtherie	Reisende in Regionen mit Diphtherie - Risiko
FSME (Zeckenzephalitis)	Reisende in Risikogebiete Teile Bayerns, des Schwarzwalds, Österreichs, Polen, der Schweiz, der Slowakei, Südschwedens, Tschechiens, Ungarns, der baltischen Staaten, Südosteuropas (Saisonalität beachten)
Gelbfieber	Reisende in von der WHO bekanntgegebenen Gelbfieberinfektionsgebiete (Länder des tropischen Afrika und Südamerika)
Hepatitis A	Reisende in Gebiete des südlichen und östlichen Mittelmeerraumes, Türkei, Osteuropa, Naher Osten, Indien, Südostasien, sowie alle Gebiete Afrikas, Lateinamerikas und des fernen Ostens mit risikoreichen Hygienebedingungen
Hepatitis B	Reisende in Endemiegebiete bei engen Kontakten zur einheimischen Bevölkerung
Meningokokken	Reisende in aktuelle Endemiegebiete und bei Aufenthalten im Meningitisgürtel Afrikas
Poliomyelitis (IPV)	Reisende in Länder mit Poliorisiko, Osteuropa, tropische und subtropische Länder
Tollwut	Reisende in Regionen mit hoher Tollwutgefährdung
Typhus	Reisende in Endemiegebiete